

Massage à Friction Profonde : Table des Résultats

Auteur, année, pays, type, score PEDro, note de qualité	Taille de l'échantillon	Intervention	Résultats et signification : (+) significatif (-) non significatif
<p>Rasool et al., 2017</p> <p>Pakistan</p> <p>ECR</p> <p>8/10</p> <p>Haute qualité</p>	<p>N = 60 enfants atteints de la PC diplégique spastique</p> <p>Âge au moment de l'inscription : 3-9 ans</p> <p>Diagnostic de la PC : 100%</p> <p>Type de la PC : Diplégique</p> <p>Niveau GMFCS (Gross Motor Function Classification System) : S. O.</p>	<p>Massage à friction croisée et traitement de physiothérapie habituel (n = 30)</p> <p>vs.</p> <p>Traitement de physiothérapie habituel (n = 30)</p> <p><u>Détails de l'intervention :</u></p> <p><i>Les deux groupes :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Séances de 30 minutes • 5 fois par semaine • Pendant 6 semaines <p><i>Traitement de physiothérapie habituel (les deux groupes) :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Thermothérapie pendant 15 minutes • Traitement Bobath (postures inhibitrices réflexes) • Étirement du tendon d'Achille (10 répétitions de 8 secondes) <p><i>Massage à friction croisée :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur les deux jambes, au niveau du soléaire et du gastrocnémien, le long du tendon d'Achille. • Le thérapeute commençait toujours par la jambe droite 	<p>Après le traitement (6 semaines) :</p> <p><i>Spasticité :</i></p> <p>(-) Échelle modifiée d'Ashworth (Modified Ashworth Scale : MAS)</p> <p><i>Niveau moteur fonctionnel :</i></p> <p>(-) Functional Level Scale</p>

Massage à Friction Profonde : Table des Résultats
